

DARE TO BE AWARE



GYNAECOLOGIE

De meest voorkomende hiv indicator ziekten met een prevalentie >0.1% binnen de gynaecologie zijn:

Cervixcarcinoom

Cervicale dysplasie


Sinds 2004 krijgt iedere zwangere een hiv test aangeboden

Zwangerschap

Gravida

Prevalentie onderliggende hiv infectie

0,04%



acceptatie hiv screening

<1

moeder-kind transmissie (per jaar)

Mensen met een hiv diagnose in Nederland

cijfers eind 2018 volgens Stichting hiv Monitoring



16.422

Mannen in zorg



3.682

Vrouwen in zorg



1900 (naar schatting)

Mensen unaware

van hun onderliggende hiv infectie




Baarmoederhalskanker

Cervixcarcinoom

Prevalentie onderliggende hiv infectie

1,00%



1,00%

8

jaarlijks gemiste hiv diagnoses (naar schatting)



acceptatie hiv screening

niet meetbaar

N=N

niet overdraagbaar

Door adequate behandeling van hiv wordt de overdracht 100% voorkomen.

DE WERELD AIDSVRIJ IN 2030

Het standaard inzetten van hiv screening bij hiv indicatorziekten, ongeacht leeftijd, afkomst en seksuele voorkeur **vermindert** de stigmatisering rondom hiv en **optimaliseert** de gezondheidszorg.

